Guide de prescription des demandes d'adaptation posologique des immunosuppresseurs.

Afin de simplifier les demandes d'analyses pharmacocinétiques des immunosuppresseurs, ce guide vous présentera, outre les feuilles classiques à utiliser pour toute demande d'adaptation de posologie des immunosuppresseurs, les feuilles de demandes spécifiques contenant les renseignements complémentaires indispensables pour l'utilisation des modèles pharmacocinétiques. **Ces feuilles doivent impérativement être remplies entièrement, le logiciel bloquant l'envoi de toute demande incomplète.**

Pour toute demande d'AUC, les modèles existants et les temps de prélèvements à effectuer sont les suivants :

Indication	Population	Tacrolimus				
		PORGRAF	MODIGRAF	ADVAGRAF	ENVARUS	Autre
Transplantation rénale	Adultes	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 8h - 12h	0 - 1h - 3h
	Enfants	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 8h - 12h	0 - 1h - 3h
Transplantation hépatique	Adultes	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 4h	0 - 8h - 12h	0 - 1h - 3h
	Enfants	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 8h - 12h	0 - 1h - 3h
Transplantation cardiaque	Adultes	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 8h - 12h	0 - 1h - 3h
	Enfants	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 8h - 12h	0 - 1h - 3h
Transplantation pulmonaire	Adultes	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 8h - 12h	0 - 1h - 3h
	Enfants	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 8h - 12h	0 - 1h - 3h
Greffe de moelle	Adultes	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 8h - 12h	0 - 1h - 3h
	Enfants	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 8h - 12h	0 - 1h - 3h
	tous ages en IV					
Lupus	Adultes	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 8h - 12h	0 - 1h - 3h
	Enfants	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 8h - 12h	0 - 1h - 3h
Syndrome néphrotique	Enfants	/	/	/	/	/
Autre	Adultes	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 8h - 12h	0 - 1h - 3h
	Enfants	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h	0 - 8h - 12h	0 - 1h - 3h

CHU de Clermont-
Ferrand -
PHARMACOLOGIE
TOXICO
58, rue Montalembert
63000 CLERMONT
FERRAND

**PROTOCOLE DE PRELEVEMENTS DES
IMMUNOSUPPRESSEURS EN FONCTION
DES INDICATIONS**

Ref : PH-ANA-HP-MO-008
Version : 01
Applicable le : 23-05-2022

Indication	Population	Acide mycophénolique		Everolimus	Sirolimus
		CELLCEPT	MYFORTIC		
Transplantation rénale	Adulte	20min - 1h - 3h	0 - 20min - 1h - 2h - 4h - 6h	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 3h
	Enfant	20min - 1h - 3h	- 8h - 10h - 12h	0 - 1h - 2h - 3h - 4h	0 - 1h - 2h - 3h - 4h
Transplantation hépatique	Adulte	20min - 1h - 3h	0 - 20min - 1h - 2h - 4h - 6h	0 - 1h - 2h - 3h - 4h	0 - 1h - 2h - 3h - 4h
	Enfant	20min - 1h - 3h	- 8h - 10h - 12h	0 - 1h - 2h - 3h - 4h	0 - 1h - 2h - 3h - 4h
Transplantation cardiaque	Adulte	20min - 1h - 3h	0 - 20min - 1h - 2h - 4h - 6h	0 - 1h - 3h	0 - 1h - 2h - 3h - 4h
	Enfant	20min - 1h - 2h - 3h - 4h	- 8h - 10h - 12h	0 - 1h - 2h - 3h - 4h	0 - 1h - 2h - 3h - 4h
Transplantation pulmonaire	Adulte	20min - 1h - 3h	0 - 20min - 1h - 2h - 4h - 6h	0 - 1h - 2h - 3h - 4h	0 - 1h - 2h - 3h - 4h
	Enfant	20min - 1h - 2h - 3h - 4h	- 8h - 10h - 12h	0 - 1h - 2h - 3h - 4h	0 - 1h - 2h - 3h - 4h
Greffe de moelle	Adulte	20min - 1,5h - 4h		0 - 1h - 2h - 3h - 4h	0 - 1h - 2h - 3h - 4h
	Enfant	20min - 1h - 2h - 3h - 4h		0 - 1h - 2h - 3h - 4h	0 - 1h - 2h - 3h - 4h
	Tous âges IV	Depuis début perf 20min - 1h + Fin perf 0 - 1h - 3h			
Lupus	Adulte	40min - 2h - 3h		0 - 1h - 2h - 3h - 4h	0 - 1h - 2h - 3h - 4h
	Enfant	20min - 1h - 3h		0 - 1h - 2h - 3h - 4h	0 - 1h - 2h - 3h - 4h
Syndrome néphrotique	Enfant	20min - 1h - 2h - 3h - 4h		/	/
Autre	Adulte	20min - 1h - 2h - 3h - 4h		0 - 1h - 2h - 3h - 4h	0 - 1h - 2h - 3h - 4h
	Enfant	20min - 1h - 2h - 3h - 4h		0 - 1h - 2h - 3h - 4h	0 - 1h - 2h - 3h - 4h

CHU de Clermont-
Ferrand -
PHARMACOLOGIE
TOXICO
58, rue Montalembert
63000 CLERMONT
FERRAND

**PROTCOLE DE PRELEVEMENTS DES
IMMUNOSUPPRESSEURS EN FONCTION
DES INDICATIONS**

Ref : PH-ANA-HP-MO-008
Version : 01
Applicable le : 23-05-2022

Etiquette du patient

Service de Pharmacologie
Laboratoire de Pharmacologie & Toxicologie
Centre de Biologie
1^{er} étage
HOPITAL GABRIEL MONTPIED

Prescripteur :

Préleveur :

PHARMACOCINETIQUE DE CELLCEPT ®

A remplir impérativement en détail pour la réalisation des calculs

Contexte :

Si greffe, type de greffe : _____

Si greffe, date de greffe : __/__/____

Si maladie auto-immune, type : _____

Date de prélèvement : __/__/____

Patient Diabétique : Oui / Non

Patient mucoviscidose : Oui / Non

Posologie du mycophénolate :

Dose matin : _____ mg

Dose midi : _____ mg

Dose soir : _____ mg

comprimé gélule solution buvable

Traitements associés :

ciclosporine tacrolimus

évérolimus sirolimus

corticoïdes néant

Autres traitements :

Date de **début** de traitement **ou** de dernière

modification de posologie : __/__/____

Horaires de prises :

La veille de la cinétique : __ h __

Le matin de la cinétique : __ h __

Motif de la demande :

non réponse effets indésirables

suivi systématique

Horaires théoriques de prélèvement sur : https://pharmaco.chu-limoges.fr/ Outils disponibles	Heure réelle de prélèvement	Remarques : - Prise de médicament, repas, autre
T + 20 mn		
T + 1H		
T + 1,5H		
T + 2H		
T + 3H		
T + 4H

CHU de Clermont-
Ferrand -
PHARMACOLOGIE
TOXICO
58, rue Montalembert
63000 CLERMONT
FERRAND

**PROTOCOLE DE PRELEVEMENTS DES
IMMUNOSUPPRESSEURS EN FONCTION
DES INDICATIONS**

Ref : PH-ANA-HP-MO-008
Version : 01
Applicable le : 23-05-2022

Service de Pharmacologie
Laboratoire de Pharmacologie & Toxicologie
Centre de Biologie
1^{er} étage
HOPITAL GABRIEL MONTPIED

Etiquette du patient

Prescripteur :

Préleveur :

CAS PARTICULIER
PHARMACOCINETIQUE DE MYFORTIC®
A remplir impérativement en détail pour la réalisation des calculs

Contexte :

Si greffe, type de greffe : _____

Si greffe, date de greffe : __/__/____

Posologie de l'acide mycophénolique :

Dose matin : _____ mg

Dose midi : _____ mg

Dose soir : _____ mg

Date de début de traitement ou de dernière

modification de posologie : __/__/____

Motif de la demande :

non réponse effets indésirables

suivi systématique

Date de prélèvement : __/__/____

Patient Diabétique : *Oui / Non*

Patient mucoviscidose : *Oui / Non*

Traitements associés :

ciclosporine tacrolimus

évérolimus sirolimus

corticoïdes néant

Autres traitements :

Horaires de prises :

La veille de la cinétique : __ h __

Le matin de la cinétique : __ h __

Horaires théoriques de prélèvement à réaliser	Heure réelle de prélèvement	Remarques : - Prise de médicament, repas, autre
T0		
T + 20 mn		
T + 1H		
T + 2H		
T + 4H		
T + 6H		
T + 8H		
T + 10H		
T + 12H

CHU de Clermont-
Ferrand -
PHARMACOLOGIE
TOXICO
58, rue Montalembert
63000 CLERMONT
FERRAND

**PROTOCOLE DE PRELEVEMENTS DES
IMMUNOSUPPRESSEURS EN FONCTION
DES INDICATIONS**

Ref : PH-ANA-HP-MO-008
Version : 01
Applicable le : 23-05-2022

Service de Pharmacologie
Laboratoire de Pharmacologie & Toxicologie
Centre de Biologie
1^{er} étage
HOPITAL GABRIEL MONTPIED

Etiquette du patient

Prescripteur :

Préleveur :

PHARMACOCINETIQUE DE NEORAL®

A remplir impérativement en détail pour la réalisation des calculs

Contexte :

Si greffe, type de greffe : _____

Si greffe, date de greffe : __/__/____

Si maladie auto-immune, type : _____

Posologie de ciclosporine :

Dose matin : _____ mg

Dose midi : _____ mg

Dose soir : _____ mg

Date de **début** de traitement **ou** de dernière
modification de posologie : __/__/____

Motif de la demande :

non réponse effets indésirables

suivi systématique

Date de prélèvement : __/__/____

Patient Diabétique : Oui / Non

Patient mucoviscidose : Oui / Non

Traitements associés :

mycophénolate tacrolimus

évérolimus sirolimus

corticoïdes néant

Autres traitements :

Horaires de prises :

La veille de la cinétique : __ h __

Le matin de la cinétique : __ h __

Horaires théoriques de prélèvement sur : https://pharmaco.chu-limoges.fr/ Outils disponibles	Heure réelle de prélèvement	Remarques : - Prise de médicament, repas, autre
T0		
T + 1H		
T + 2H		
T + 3H		
T + 4H

CHU de Clermont-
Ferrand -
PHARMACOLOGIE
TOXICO
58, rue Montalembert
63000 CLERMONT
FERRAND

**PROTOCOLE DE PRELEVEMENTS DES
IMMUNOSUPPRESSEURS EN FONCTION
DES INDICATIONS**

Ref : PH-ANA-HP-MO-008
Version : 01
Applicable le : 23-05-2022

Service de Pharmacologie
Laboratoire de Pharmacologie & Toxicologie
Centre de Biologie
1^{er} étage
HOPITAL GABRIEL MONTPIED

Etiquette du patient

Prescripteur :

Préleveur :

PHARMACOCINETIQUE DE TACROLIMUS
A remplir impérativement en détail pour la réalisation des calculs

Contexte :

Si greffe, type de greffe : _____

Si greffe, date de greffe : __/__/____

Posologie de tacrolimus :

Dose matin : _____ mg

Dose midi : _____ mg

Dose soir : _____ mg

Spécialité :

Prograf Advagraf Envarsus

Hématocrite : __ %

Motif de la demande :

non réponse effets indésirables

suivi systématique

Date de prélèvement : __/__/____

Date de **début** de traitement **ou** de dernière

modification de posologie : __/__/____

Patient Diabétique : Oui / Non

Patient mucoviscidose : Oui / Non

Traitements associés :

mycophénolate ciclosporine

évérolimus sirolimus

corticoïdes néant

Autres traitements :

Horaires de prises :

La veille de la cinétique : __ h __

Le matin de la cinétique : __ h __

Horaires théoriques de prélèvement sur : https://pharmaco.chu-limoges.fr/ Outils disponibles	Heure réelle de prélèvement	Remarques : - Prise de médicament, repas, autre
T0		
T + 1H		
T + 3H		
T + 8H		
T + 12H

CHU de Clermont-
Ferrand -
PHARMACOLOGIE
TOXICO
58, rue Montalembert
63000 CLERMONT
FERRAND

**PROTOCOLE DE PRELEVEMENTS DES
IMMUNOSUPPRESSEURS EN FONCTION
DES INDICATIONS**

Ref : PH-ANA-HP-MO-008
Version : 01
Applicable le : 23-05-2022

Service de Pharmacologie
Laboratoire de Pharmacologie & Toxicologie
Centre de Biologie
1^{er} étage
HOPITAL GABRIEL MONTPIED

Etiquette du patient

Prescripteur :

Préleveur :

PHARMACOCINETIQUE D' EVEROLIMUS
A remplir impérativement en détail pour la réalisation des calculs

Contexte :

Si greffe, type de greffe : _____

Si greffe, date de greffe : __ / __ / ____

Posologie d'évérolimus :

Dose matin : _____ mg

Dose midi : _____ mg

Dose soir : _____ mg

Date de début de traitement **ou** de dernière
modification de posologie : __ / __ / ____

Motif de la demande :

- non réponse effets indésirables
 suivi systématique

Date de prélèvement : __ / __ / ____

Patient Diabétique : *Oui / Non*

Patient mucoviscidose : *Oui / Non*

Traitements associés :

- mycophénolate tacrolimus
 ciclosporine sirolimus
 corticoïdes néant

Autres traitements :

Horaires de prises :

La veille de la cinétique : __ h __

Le matin de la cinétique : __ h __

Horaires théoriques de prélèvement sur : https://pharmaco.chu-limoges.fr/ Outils disponibles	Heure réelle de prélèvement	<u>Remarques :</u> - Prise de médicament, repas, autre
T0		
T + 1H		
T + 2H		
T + 3H		
T + 4H

CHU de Clermont-
Ferrand -
PHARMACOLOGIE
TOXICO
58, rue Montalembert
63000 CLERMONT
FERRAND

**PROTOCOLE DE PRELEVEMENTS DES
IMMUNOSUPPRESSEURS EN FONCTION
DES INDICATIONS**

Ref : PH-ANA-HP-MO-008
Version : 01
Applicable le : 23-05-2022

Service de Pharmacologie
Laboratoire de Pharmacologie & Toxicologie
Centre de Biologie
1^{er} étage
HOPITAL GABRIEL MONTPIED

Etiquette du patient

Prescripteur :

Préleveur :

PHARMACOCINETIQUE DE **SIROLIMUS**

A remplir impérativement en détail pour la réalisation des calculs

Contexte :

Si greffe, type de greffe : _____

Si greffe, date de greffe : __ / __ / _____

Date de prélèvement : __ / __ / _____

Patient Diabétique : Oui / Non

Patient mucoviscidose : Oui / Non

Posologie de sirolimus :

Dose matin : _____ mg

Dose midi : _____ mg

Dose soir : _____ mg

Traitements associés :

mycophénolate

tacrolimus

évérolimus

ciclosporine

corticoïdes

néant

Date de **début** de traitement **ou** de dernière

modification de posologie : __ / __ / _____

Autres traitements :

Horaires de prises :

La veille de la cinétique : __ h __

Le matin de la cinétique : __ h __

Motif de la demande :

non réponse effets indésirables

suivi systématique

Horaires théoriques de prélèvement sur : https://pharmaco.chu-limoges.fr/ Outils disponibles	Heure réelle de prélèvement	Remarques : - Prise de médicament, repas, autre
T0		
T + 1H		
T + 2H		
T + 3H		
T + 4H

ANNEXE : CAS PARTICULIER

Cinétique de Cellcept® en cas de perfusion pour Allogreffe

Si perfusion sur plus de 12 heures :

Faire un prélèvement immédiatement après l'arrêt de la perfusion.

Donc 1 prélèvement : T_0 (*arrêt de perfusion*)

Si durée de perfusion entre 2 heures et 12 heures :

Faire un prélèvement immédiatement après l'arrêt de la perfusion, ainsi que une heure, deux heures et trois heures après l'arrêt.

Donc 4 prélèvements : T_0 (*arrêt de perf.*), $T_0 + 1h$, $T_0 + 2h$, $T_0 + 3h$

Si perfusion sur 2 heures :

- Deux prélèvements *PENDANT* la perfusion (*bras opposé*) :
20 minutes après le début de perfusion
1 heure après le début de perfusion
- Trois prélèvements *APRES* l'*ARRET* de la perfusion :
Immédiatement après l'arrêt de la perfusion
1 heure après l'arrêt de la perfusion
3 heures après l'arrêt de la perfusion

Donc 5 prélèvements : T_p (*début de perfusion*) + 20 minutes, $T_p + 1h$, T_0 (*arrêt de perfusion*), $T_0 + 1h$, $T_0 + 3h$

Informations à expliciter sur la prescription d'AUC de Cellcept® :

Les heures de début et de fin de perfusion ainsi que les heures de prélèvements

CHU de Clermont-
Ferrand -
PHARMACOLOGIE
TOXICO
58, rue Montalembert
63000 CLERMONT
FERRAND

**PROTOCOLE DE PRELEVEMENTS DES
IMMUNOSUPPRESSEURS EN FONCTION
DES INDICATIONS**

Ref : PH-ANA-HP-MO-008
Version : 01
Applicable le : 23-05-2022

**PHARMACOCINETIQUE DE CELLCEPT®
sans association à la ciclosporine**

**SYNDROME NEPHROTIQUE PEDIATRIQUE
Doc D**

A compléter et à joindre à la fiche du CELLCEPT

**Cinétique du Cellcept®
sans association à la ciclosporine**

Etiquette patient

Indications cinétique

☐ Initiation du traitement par MMF	☐ Contrôle du traitement d'entretien
☐ Contrôle d'une adaptation PK antérieure	☐ Rechute
☐ Effet indésirable	☐ Bilan annuel systématique
- Lequel :

Statut du patient au moment de la cinétique

☐ Patient en rémission récente	☐ Patient en rémission stable
☐ Patient en rechute partielle	☐ Patient en rechute récente
☐ Patient en pleine rechute	

Quelle est pour vous l'efficacité du MMF au moment de la cinétique ?

☐ Efficacité maximale	☐ Efficacité partielle	☐ Peu efficace
☐ Pas efficace	☐ Trop tôt pour dire quoi que ce soit	

Quelle est pour vous la toxicité du MMF au moment de la cinétique

- Aucun effet secondaire
 Effets secondaires modérés ne nécessitant pas de diminuer la dose
 Effets secondaires moyens motivant une diminution de la dose
 Effets secondaires importants poussant à un arrêt du traitement

Informations concernant le syndrome néphrotique

☐ Cortancyl → Dose par prise (mg) : _____	Nombre de prise par jour : _____
☐ Tacrolimus → Dose par prise (mg) : _____	Nombre de prise par jour : _____
☐ Autres traitements. Préciser :	

Protidémie (g/L) : _____ Albuminémie (g/L) : _____
Protéinurie (g/L) : _____ Créatininémie (μmol/L) : _____

Créatininurie (μmol/L) : _____
Bandelettes urinaires : 0 traces + ++ +++ ++++

CHU de Clermont-
Ferrand -
PHARMACOLOGIE
TOXICO
58, rue Montalembert
63000 CLERMONT
FERRAND

**PROTOCOLE DE PRELEVEMENTS DES
IMMUNOSUPPRESSEURS EN FONCTION
DES INDICATIONS**

Ref : PH-ANA-HP-MO-008
Version : 01
Applicable le : 23-05-2022

PHARMACOCINETIQUE DE CELLCEPT®
En association à la ciclosporine

SYNDROME NEPHROTIQUE PEDIATRIQUE

Doc E

A compléter et à joindre à la fiche du CELLCEPT

Cinétique du Cellcept®
En association à la ciclosporine

Etiquette patient

Indications cinétique

☐ Initiation du traitement par MMF	☐ Contrôle du traitement d'entretien
☐ Contrôle d'une adaptation PK antérieure	☐ Rechute
☐ Effet indésirable	☐ Bilan annuel systématique
- Lequel :

Statut du patient au moment de la cinétique

☐ Patient en rémission récente	☐ Patient en rémission stable
☐ Patient en rechute partielle	☐ Patient en rechute récente
☐ Patient en pleine rechute	

Quelle est pour vous l'efficacité du MMF au moment de la cinétique ?

☐ Efficacité maximale	☐ Efficacité partielle	☐ Peu efficace
☐ Pas efficace	☐ Trop tôt pour dire quoi que ce soit	

Quelle est pour vous la toxicité du MMF au moment de la cinétique

☐ Aucun effet secondaire
☐ Effets secondaires modérés ne nécessitant pas de diminuer la dose
☐ Effets secondaires moyens motivant une diminution de la dose
☐ Effets secondaires importants poussant à un arrêt du traitement

Informations concernant le syndrome néphrotique

☐ Cortancyl → Dose par prise (mg) : _____	Nombre de prise par jour : _____
☐ Ciclosporine → Dose par prise (mg) : _____	Nombre de prise par jour : _____
☐ Tacrolimus → Dose par prise (mg) : _____	Nombre de prise par jour : _____
☐ Autres traitements. Préciser :	

Protidémie (g/L) : _____

Albuminémie (g/L) : _____

Protéinurie (g/L) : _____

Créatininémie (µmol/L) : _____

Créatininurie (µmol/L) : _____

Bandelettes urinaires : 0 traces + ++ +++ ++++

Poids : ___ kg

Taille : ___ cm